



ករណីសំខាន់ ស្តីពីរឿងថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងភាពអាសន្ន ហៅថា អ៊ី ស៊ី (EC)

ថ្នាំ អ៊ីស៊ី គ្មានគ្រោះថ្នាក់ ហើយមានប្រសិទ្ធិភាព សំរាប់ការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្រោយពេលរួមភេទ

ការជ្រើសយកថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងភាពអាសន្ន អ៊ី ស៊ី (EC) នេះមកប្រើ បើសិនជា:

- អ្នកមិនប្រើថ្នាំការពារកុំឲ្យមានកូននៅពេលរួមភេទ ។
- អ្នកគិតថា ថ្នាំការពារមិនឲ្យមានកូនរបស់អ្នក គ្មាន ប្រសិទ្ធិភាព ។

តើថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ភាពអាសន្ន (EC) ជាអ្វី?

ថ្នាំគ្រាប់ អ៊ី ស៊ី (EC) គឺជាថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ដូចគ្នានឹងថ្នាំកុំឲ្យមានកូនធម្មតាដែរ ។ ថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ក្នុងភាពអាសន្ន (EC) មានបីប្រភេទ :

- ថ្នាំគ្រាប់ ប្លែនប៊ី មានតែប្រូស្តេសស្ទីនប៉ុណ្ណោះ ។
- ថ្នាំគ្រាប់ ត្រីនីន អេសស្ត្រូជ័ន រួមចូល ប្រូស្តេសស្ទីន ។
- ថ្នាំគ្រាប់ លេបការពារកុំឲ្យមានកូន កំរិតខ្លាំងធម្មតា ។

កុំភ័យ ! ប្រើថ្នាំ អ៊ី ស៊ី (EC) ជាបន្ទាន់ បើសិនជាអាច

- វាជាការល្អបំផុត បើប្រើ អ៊ី ស៊ី ក្នុងកំឡុងបីថ្ងៃដែល មិនបានប្រើថ្នាំការពារកុំឲ្យមានកូនអ្វី ពេលរួមភេទ ។
- បើប្រើថ្នាំ អ៊ី ស៊ី (EC) ឲ្យបានឆាប់ គឺកាន់តែល្អ ។
- ពេលមានបន្ថែម សុំសួរគ្រូពេទ្យ ឬ អ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យ ។

ថ្នាំអ៊ី ស៊ី (EC) គ្មានគ្រោះថ្នាក់ ហើយមានប្រសិទ្ធិភាព

- ថ្នាំគ្រាប់ ប្រូស្តេសស្ទីនជួយបន្ថយកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះបាន ៨៩ % ភាគរយ ។*
- ថ្នាំគ្រាប់ អេសស្ត្រូជ័ន / ប្រូស្តេសស្ទីន រួមគ្នា គឺជួយ បន្ថយកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះបាន ៨៥% ភាគរយ ។*
- សំរាប់ការប្រើប្រាស់ វេលាយូរនោះ វិធីការពារកុំឲ្យ មានកូនផ្សេងៗ មានប្រសិទ្ធិភាពជាងថ្នាំអ៊ី ស៊ី(EC) ។
- ថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងភាពអាសន្ននេះ មិន អាចការពាររោគគ្រុនកម្រិតរួមភេទបានឡើយ រួមទាំង អេដ អាយ វី និង អេដស៍ (HIV/AIDS) ។

*ការបន្ថយកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ អាស្រ័យទៅលើការប្រើ តែម្តង ។

អ៊ី ស៊ី (EC) មិនអាចឲ្យទារកក្នុងផ្ទៃលូតបានទេ:

- ថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងភាពអាសន្ន គឺមិនមែន ។ ដូចគ្នានឹងថ្នាំ អ៊ី យូ - 486 (ថ្នាំគ្រាប់ជួយរំលូតកូន) ។
- ថ្នាំការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះក្នុងភាពអាសន្ន គ្មានប្រសិទ្ធិ ភាពទេ គឺបើសិនជាអ្នកមានផ្ទៃពោះរួចទៅហើយៗ ក៏មិន អាចបញ្ឈប់វាបានដែរ ។

អ៊ីស៊ី (EC) គ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃទេ

- បើសិនជាអ្នកកំពុងមានផ្ទៃពោះ ហើយប្រើថ្នាំនេះ គឺ វាមិនអាចឲ្យទារកក្នុងផ្ទៃមានគ្រោះថ្នាក់បានទេ ។
- ថ្នាំ គ្រាប់អ៊ី ស៊ី មិនអាចរារាំងស្ត្រីក្នុងការមានផ្ទៃពោះ នៅពេលអនាគតបានឡើយ ។

ស្ត្រីគ្រប់រូប អាចរក្សាថ្នាំគ្រាប់នេះ នៅជាប់ក្នុងផ្ទះសំរាប់ ភាពអាសន្ន

- ស្ត្រីភាគច្រើនយល់ឃើញថា ជាការងាយស្រួលម្យ៉ាង ដែលត្រូវមានថ្នាំអ៊ី ស៊ី នៅជិតដៃ ពេលមានអាសន្ន។
- គ្រូពេទ្យ ឬ អ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យ អាចផ្តល់ថ្នាំនេះឲ្យអ្នក មុនពេលដែលអ្នកត្រូវការ ។

ផែនការពិនិត្យសុខភាព ក្រោយពេលប្រើថ្នាំគ្រាប់ការពារ កុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ក្នុងភាពអាសន្ន អ៊ី ស៊ី (EC) រួច

- បើសិនជាអ្នកមិនធ្លាក់រដូវក្នុងកំឡុងពេលបីអាទិត្យ សូមអ្នក ទៅធ្វើតេស្តផ្សេងៗ មានផ្ទៃពោះ ឬអត់ ។
- ជាការសំខាន់ណាស់ ដែលអ្នកត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ ឬ មន្ទីរពិនិត្យរោគ បើសិនជាអ្នកត្រូវការថ្នាំការពារកុំឲ្យ មានកូនធម្មតា ឬពត៌មាន ពិរិទ្ធិការពាររោគគ្រុនកម្រិតរួមភេទ និងអេដស៍(HIV/AIDS) ។

នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ស្ត្រី និងបុរសគ្រប់រូបដែលមាន ប្រាក់ចំណូលតិច អាចមានសន្តិទុក្ខល្អពីក្រសួង រៀបចំគ្រួសារដោយឥតគិតថ្លៃ គឺតាមរយៈកម្មវិធី តាក់ (PACT) ។

បើសិនជាអ្នកគ្មានមន្ទីរពិនិត្យ ឬ គ្រូពេទ្យ ប្រចាំខ្លួនទេ សុំទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-942-1054 ដើម្បីរកកម្មវិធីគ្រួសារ តាក់ (PACT) ដែលនៅក្បែរអ្នក